

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRAFICA DEL TFE
 IALAREN BURUZKO BIBLIOGRAFIAREN DESKRIBAPENA

Grado/gradu <input type="checkbox"/>	Año	Urtea	Título del TFE	IALaren Izena
Master <input checked="" type="checkbox"/>	2017		CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON TRATADOS CON TERAPIAS AVAN	

Autor			Egilea		
Apellido primero	Lehen deitura	Apellido segundo	Bigarren deitura	Nombre	Izena
CABELLO		GONZALEZ		CAROLINA	

Titulación	Titulazioa
M.U. en Investigación en Ciencias de la Salud / U.M. Osasun Zientzietako Ikerketan <input type="checkbox"/>	

Director del TFE	IALaren zuzendaria
PAULA CAMELIA TRANDAFIR	UPNA/NUP <input checked="" type="radio"/> otro/beste bat <input type="radio"/>

Codirector del TFE	IALaren zuzendarikidea
GREGORIO TIBERIO LOPEZ	UPNA/NUP <input checked="" type="radio"/> otro/beste bat <input type="radio"/>

Castellano Gaztelania	Abstract (resumen de 100-250 palabras)	Abstract (laburpena 100-250 hitzetan)
--------------------------	--	---------------------------------------

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad crónica y progresiva que ocupa el segundo lugar en enfermedades neurodegenerativas detrás de la Enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos disponibles vía oral y transdérmica, proporcionan una mejoría sintomática y de la calidad de vida importante durante los primeros años de la evolución de la enfermedad. A medida que la enfermedad progresa, aparecen diversas complicaciones motoras y no motoras, que no se controlan adecuadamente con la terapia convencional.

Nuestro objetivo fue conocer el impacto sobre la calidad de vida en pacientes con EP avanzada en tratamiento con terapias como la intervención quirúrgica para la inserción de neuroestimuladores, la administración de Apomorfina subcutánea en infusión continua o la bomba de levodopa a través del duodeno, Duodopa.

Método: estudio observacional, prospectivo, no aleatorizado. Los instrumentos elegidos fueron las escalas de calidad de vida genérica EQ5D y la escala específica para la EP PDQ39. Se solicitó la colaboración de los pacientes para la cumplimentación de las escalas en el momento que el neurólogo experto en Trastornos del movimiento consideró oportuno iniciar alguna de las tres terapias antes mencionadas. Se llevaron a cabo tres mediciones, la primera previa al inicio de la terapia avanzada, la segunda a los 3-5 meses y la tercera a los 6-10 meses. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 20, asumiendo un nivel de confianza del 95%.

Los resultados confirman que existe mejoría estadísticamente significativa en la escala EQ5D en la movilidad, el dolor, la ansiedad y el termómetro de autvaloración de la propia salud. La escala PDQ39 muestra mejoría significativa en el bienestar emocional, el estigma, el estado cognitivo y la valoración global de la escala.

Se ha identificado como factor negativo modificador de la calidad de vida, el incremento en el apoyo social que requieren este tipo de pacientes al someterse a una terapia avanzada.

Materias o Palabras claves (máximo 5)	Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5)
Enfermedad de Parkinson, calidad de vida, apomorfina, duodopa	